

## **АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КЛЕЩЕЙ**

**При обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться:**

**в районах области:**

- в приемное отделение центральной районной больницы или фельдшерско-акушерский пункт;

**в городе Кургане:**

- в детский травматологический пункт ГБУ «Курганская детская поликлиника» (улица К. Мяготина, 114) - ежедневно с 8.00 – 22.00;

- ГБУ «Больница скорой медицинской помощи» (ул. Кирова, 65) - круглосуточно.

**в городе Шадринске:**

- ГБУ «Шадринская детская больница» (город Шадринск, ул. Ефремова, 17) - в рабочие дни с 8.00 – 19.00, суббота с 8.00 до 16.00,

- ГБУ «Шадринская городская больница» (г. Шадринск, ул. Михайловская, 64) - круглосуточно.



*Медицинские работники удалят клеща с тела пострадавшего и проведут экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.*

*Надо помнить, что иммуноглобулин вводят в организм в течение первых трех дней после укуса, а желательно в первые сутки.*

**Первичную консультацию можно получить**

**по телефону 03**

**Если вы обнаружили клеща, а обратиться в медицинскую организацию по какой-либо причине нет возможности, то можно удалить его самостоятельно.**

Существует несколько способов удаления клещей. Они отличаются только инструментом, которым удаляется клещ.

1. Удалить клеща специальным **изогнутым пинцетом-крючком**. Для этого нужно захватить клеща как можно ближе к хоботку, начиная подтягивать и вращать его вокруг своей оси. Через 2-3 оборота клещ будет извлечен целым вместе с хоботком. Нельзя дергать клеща, так как можно разорвать его или оторвать головку.



2. Клеща можно удалить **при помощи нитки**. Сделать петлю из прочной нити, захватить клеща, накинув петлю как можно ближе к коже и аккуратно вытянуть, пошатывая его в разные стороны и делая вращательные движения.

3. Если нет ни пинцета, ни нити, **оберните пальцы чистым бинтом**, захватите клеща как можно ближе к коже и осторожно вращательными движениями аккуратно вытяните его.

Важно не раздавить клеща, иначе вирус интенсивно обсеменит ранку.

Ранку необходимо обработать любым раствором антисептика (спиртом или йодом).

Обязательно после проведенной процедуры вымыть руки и пинцет. Удаленного клеща, если он остался жив, поместить в стеклянную баночку с плотно закрывающейся крышкой с небольшим кусочком влажного бинта или ваты, чтобы клещ не засох и отдать на исследование. Анализ будет готов в течение двух суток.



**Для исследования клещи доставляются в г. Кургане по адресу:**

- **в будние дни:** ул. М. Горького, 170, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-00; в пятницу с 8-30 до 12-00, т. 24-07-95;
- **в выходные и праздничные дни:** ул. Станционная, 62 а, с 10-00 до 13-00; т. 23-42-80.

Необходимо знать, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжиться, так как в слюнных железах и протоках особи присутствует значительная концентрация вируса клещевого энцефалита.

Если оторвалась голова с хоботком и осталась в коже. Обработайте ранку йодом, через некоторое время образуется гнойник и хоботок выйдет сам. Если хоботок виден над кожей захватите его и выкрутите.

**Помните!**

- **Нельзя резко дергать клеща, когда вытаскиваете его.**
- **Не выдавливайте клеща пальцами.**
- **Не смазывайте клеща маслом, бензином и другими едкими веществами, не прижигайте клеща, органы дыхания у него закупорятся и клещ отрыгнет содержимое, что увеличит риск попадания инфекции.**
- **Место укуса нельзя ковырять иголкой или булавкой и разрезать.**
- **Иммуноглобулин можно вводить только в лечебном учреждении.**